

仕 様 書

抗ヒト NFAT (Nuclear factor of activated T-cells) c1 モノクローナル抗体 (マウス)

コード	2ATFA01
クローン番号	Hyb-Z5302
由来	ヒト NFATc1 の断片タンパク質 (134-223 a.a.) を融合させた gp64 タンパク質を発芽型バキュロウイルスの外皮に提示させ、そのウイルスを BALB/c マウスに免疫した。免疫マウスの脾臓細胞とマウスミエローマ細胞 (NS-1) を融合して得たハイブリドーマを、無血清培地により培養して得られた培養上清
特異性	ヒト NFATc1 に特異的に反応
精製	ProteinA アフィニティー精製
Ig Class	IgG _{2a}
溶媒	PBS, pH7.2 (0.1% NaN ₃ 含有)
蛋白濃度	0.5 mg/mL
容量	0.2 mL
保管	-20 °C以下 (凍結融解の繰り返しはさけてください)
用途	Western blot

参考文献 1) Suehiro J, et al: J Biol Chem, **289**(42): 29044-29059, 2014.



〒112-0004 東京都文京区後楽 1-1-10
Tel: 03-3814-4081 Fax: 03-3814-5957
e-mail: info@tokumen.co.jp
<https://www.tokumen.co.jp/>

本製品は研究用에만使用できます。人やその他の動物の診断・治療に使用することはできません。

2ATFA011806-02

Specification Sheet

Monoclonal Antibody Against Human NFAT (Nuclear factor of activated T-cells) c1

Code	2ATFA01
Clone No.	Hyb-Z5302
Source	Culture supernatant obtained by fusing human NFATc1 protein (134-223 a.a.) with gp64 protein, presenting the protein on the surface of budded baculovirus, immunizing the baculovirus with BALB/c mice, fusing spleen cells from the immunized mice with mouse myeloma cells (NS-1), and then culturing the hybridoma obtained by the fusion in a serum-free medium
Specificity	This monoclonal antibody specifically reacts with human NFATc1.
Purification	ProteinA affinity filtration
Ig Class	IgG _{2a}
Form	PBS, pH7.2 (containing 0.1% NaN ₃)
Protein Concentration	0.5 mg/mL
Package	0.2 mL
Storage	Below -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles.
Application	Western blotting

Reference 1) Suehiro J, et al: J Biol Chem, **289**(42): 29044-29059, 2014.



INSTITUTE OF IMMUNOLOGY Co., LTD.

1-1-10, Koraku, Bunkyo-ku, Tokyo, JAPAN 112-0004

Tel: +81-3-3814-4081 Fax: +81-3-3814-5957

e-mail: info@tokumen.co.jp

<https://www.tokumen.co.jp/en>

This product is for in vitro research use only, and is not intended for use in the diagnosis or treatment of humans or animals.